

平成23年2月

お客様各位

株式会社 陽進堂

使用上の注意事項改訂のお知らせ

抗アルドステロン性利尿・降圧剤

ヨウラクトン錠25

ヨウラクトン錠50

(スピロラクトン錠)

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。(下線部分が変更箇所です。)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

改訂後			改訂前		
[使用上の注意]			[使用上の注意]		
3. 相互作用			3. 相互作用		
(2) 併用注意 (併用に注意すること)			(2) 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状 ・ 措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状 ・ 措置方法	機序・危険因子
変更無し			省略		
カリウム製剤 塩化カリウム グルコン酸カリウム アスパラギン酸カリウム等 ACE阻害剤 カプトプリル エナラプリル リシノプリル等 アンジオテンシンII 受容体拮抗剤 ロサルタンカリウム カンデサルタンシ レキセチル バルサルタン等 アリスキレン カリウム保持性利尿剤 トリアムテレン カンレノ酸カリウム シクロスポリン <u>ドロスピレノン</u>	高カリウム血症を誘発することがあるので、血清カリウム値を観察するなど十分注意する。	これらの薬剤と本剤の相加・相乗作用による血清カリウム値の上昇。 危険因子：腎障害患者、高齢者	カリウム製剤 塩化カリウム グルコン酸カリウム アスパラギン酸カリウム等 ACE阻害剤 カプトプリル エナラプリル リシノプリル等 アンジオテンシンII 受容体拮抗剤 ロサルタンカリウム カンデサルタンシ レキセチル バルサルタン等 アリスキレン カリウム保持性利尿剤 トリアムテレン カンレノ酸カリウム シクロスポリン	高カリウム血症を誘発することがあるので、血清カリウム値を観察するなど十分注意する。	これらの薬剤と本剤の相加・相乗作用による血清カリウム値の上昇。 危険因子：腎障害患者、高齢者

⇒裏面もご覧下さい

〈使用上の注意の改訂理由〉

・「相互作用」の「併用注意」の項へ「ドロスピレノン」の追記

ドロスピレノン製剤の添付文書において本剤との併用に関する注意喚起がされていることから、整合性を取るため本剤の添付文書においても追記を行い、注意喚起を致しました。

〈参考〉

DSU No. 197 (2011年3月) 掲載予定

お問い合わせは、担当MR又は弊社営業本部までご連絡ください。

(株)陽進堂 営業本部

☎ 0120-647-734 FAX 076-466-3110

以 上