

平成23年3月

お客様各位

株式会社 陽進堂

使用上の注意事項改訂のお知らせ

活性型ビタミンD₃製剤 □カルシトールカプセル0.25「YD」 □カルシトールカプセル0.5「YD」 (カルシトリオールカプセル)

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。(下線部分が変更箇所です。)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

改訂後			改訂前		
[使用上の注意] 3. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)			[使用上の注意] 3. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ビタミンD及びその誘導体 アルファカルシドール等	高カルシウム血症があらわれるおそれがある。	作用が相互に増強される。	ビタミンD及びその誘導体 アルファカルシドール等	高カルシウム血症があらわれるおそれがある。	作用が相互に増強される。
PTH製剤 テリパラチド	高カルシウム血症があらわれるおそれがある。	相加作用	記載無し		
変更無し					
省略					

〈使用上の注意の改訂理由〉

・「相互作用」の「併用注意」の項へ「PTH製剤(テリパラチド)」の追記

テリパラチド(遺伝子組換え)製剤において本剤との併用に関する注意喚起がされていることから、整合性を取るため本剤の添付文書においても追記を行い、注意喚起を致しました。

〈参考〉

DSU No. 198(2011年4月)掲載予定

お問い合わせは、担当MR又は弊社営業本部までご連絡ください。

(株)陽進堂 営業本部

☎ 0120-647-734 FAX 076-466-3110

以上