

患者さん用お知らせカード

# アトリンピスチン錠5mg / 10mg「YD」

(このカードを患者さんへの  
説明にご利用下さい。)



# アトルバスタチン錠 を服用される患者様へ

本剤は、血液中のコレステロールを減らすおくすりです。

このおくすりは、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」\*が起ることが知られています。

次のような症状がみられましたら横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談下さい。

- ◎**筋肉が痛い**
- ◎**手足の力が  
はいらぬ**
- ◎**尿の色が濃い  
(赤褐色になる)**

(裏面につづく)

副作用はどんなおくすりにもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば大事に至ることはほとんどありません。

また、他にもおくすりを服用して体調がおかしいと感じたら、先生にご相談下さい。

\*「横紋筋融解症」とは:

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿がでにくくなる)になることもあります。

株式会社 陽進堂

A001