


# クラドイド外用スプレー0.3%の使い方

(ヘパリン類似物質スプレー)


- このお薬は皮膚の水分を保持し潤いを保ちます。
- 初めて使用する際には、真っすぐに立てて4~6回程度空噴霧した後に使用してください。
- 噴霧距離と噴霧面積の目安

噴霧する距離	噴霧される面積
約10cm離して	手のひら1つ分

(スプレー容器を逆さにして噴霧しても同様です)



※このスプレー容器は逆さにしても噴霧ができます。



- 医師の指示に従い1日に1~数回患部に噴霧してください。

## 【ご使用に際しての注意】

- 耳や鼻の中に入らないように注意してください。  
また、傷口、皮膚のひび割れやただれているところには噴霧しないでください。
  - 皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- 
- 目の中や目の周辺には噴霧しないでください。  
万一、目の中に入った場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、医師または薬剤師にご相談されることをお勧めします。
  - 吸入する可能性があるので、顔面や頭部等には注意して噴霧してください。
- 
- 初めて使用する際には、真っすぐ立てて4~6回空噴霧した後、使用してください。
  - 途中で噴霧できなくなった時（薬液が少なくなって空気が入った時など）は、真っすぐ立てて空噴霧してください。
  - 使用した後は噴霧口を拭き取り、付属のキャップをしてなるべく涼しいところに保管してください。
  - 噴霧できなくなる恐れがありますので、針のようなもので突くなどして噴霧口にキズをつけないでください。
  - お子様の手の届かないところに保管してください。



製造販売元

株式会社 陽進堂  
富山県富山市婦中町萩島3697番地8号