

平成17年6月

お客様各位

株式会社 陽進堂

使用上の注意事項改訂のお知らせ

持続性ACE阻害降圧剤 アイスデン錠 25mg (アラセプリル錠)

今般、平成17年6月15日付事務連絡及び自主改訂により、下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたのでお知らせ申し上げます。(下線部分が変更箇所です。_____：事務連絡、_____：自主改訂)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

改 訂 内 容

[禁忌]の項の(3)を、

(3) デキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフエーシスを施行中の患者
[ショックを起こすことがある。(「相互作用」の項参照)]

と変更する。

[相互作用]の「併用禁忌」の項を、

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
デキストラン硫酸固定化セルロース(リポソーパー [®] 、セレソープ [®])、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール(イムソバTR [®])またはポリエチレンテレフタレート(セルソバ [®])を用いた吸着器によるアフエーシスの施行	ショックを起こすことがある。	陰性に荷電したデキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコールまたはポリエチレンテレフタレートにより血中キニン系の代謝が亢進し、本剤によりブラジキニンの代謝が妨げられ、蓄積すると考えられている。

と変更する。

裏面もご覧下さい。

- 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 -

[副作用]の「その他の副作用」の「その他」の項を、

	頻度不明
その他	全身倦怠感、浮腫、顔面のほてり、血清カリウム値の上昇、抗核抗体の陽性例、 <u>低血糖</u> ^{注3)}

注3)「その他の注意」の項参照。

と変更する。

参考

企業報告

事務連絡：DSU No.140 (2005年7月)掲載予定

自主改訂：DSU 掲載なし

以上