

平成16年7月

お客様各位

株式会社 陽進堂

使用上の注意事項改訂のお知らせ

不整脈治療剤 アジマリン錠

今般、自主改訂により、下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたのでお知らせ申し上げます。(下線部が変更箇所です。)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

改 訂 内 容

【禁忌】の項を

- (1) 刺激伝導障害(房室ブロック、洞房ブロック、脚ブロック等)のある患者
[刺激伝導障害が悪化するおそれがある。]
- (2) 塩酸バルデナフィル水和物を投与中の患者 (「相互作用」の項参照)
- (3) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

と変更する。

【重要な基本的注意】の(3)

「他の抗不整脈薬(リン酸ジソピラミド)でテルフェナジンとの併用により、QT延長、心室性不整脈を起こしたとの報告がある。」

を削除する。

【相互作用】の項に「併用禁忌」の項を新たに設け

- (1) 併用禁忌 (併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
<u>塩酸バルデナフィル水和物</u> <u>レビトラ</u>	<u>QT延長をおこすおそれがある。</u>	<u>他の抗不整脈薬でQT延長が報告されており、併用により相互にQT延長作用を増強するおそれがある。</u>

と追記する。

なお、他の項は、現行のとおりとする。

<参考>

DSU No. 131 (2004年8月) 掲載予定

以上