


フルボキサミンマレイン酸塩錠「YD」 を服用される患者さまへ

製品名	フルボキサミン マレイン酸塩錠 25mg「YD」	フルボキサミン マレイン酸塩錠 50mg「YD」	フルボキサミン マレイン酸塩錠 75mg「YD」
形状 (表・裏)			

重大な注意

- うつ病やうつ状態の人は**死んでしまいたいと感じることがあります**。この薬を飲んでいる間、特に**飲みはじめや飲む量を変更した時に**、不安感が強くなり死にたいと思うなど症状が悪くなることがあるので、このような症状があらわれた場合は、医師に相談してください。
- この薬の類薬において、**18歳以下**の大うつ病性障害のある人に**有効性が確認できなかった**という報告があります。18歳未満の大うつ病性障害のある人は、医師と十分に相談してください。

ご家族の方へ

ご家族の方は、死にたいという気持ちになる、興奮しやすい、攻撃的になる、ちょっとした刺激で気持ちの変調を来すなどの患者さんの行動の変化やうつ症状などのもともとある病気の症状が悪化する危険性について医師から十分に理解できるまで説明を受け、患者さんの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、医師に連絡してください。また、患者さんご自身も病状に変化があったと感じた場合には、ご家族の方にも伝えるようにしてください。

飲み続けることで*脳内の神経伝達をスムーズにして、抑うつ気分や不安を和らげる薬が処方されています。

以下の点にご注意ください。

※飲みはじめは、すぐに効果は現れません。

(1)この薬は用法・用量を守って服用してください。

通常、1日50mgより開始し、1日2回に分けて服用します。
薬の量は症状の程度や年齢に応じて増量されます。

薬の飲み方と量は、症状等にあわせて主治医が決めます。

自己判断で薬の量を増やしたり減らしたり、あるいは中止したりしないでください。

もしも誤って多く飲んでしまったときは主治医または薬剤師に相談してください。

(2)症状がよくなっても自己判断で薬を中止しないでください。

うつ病は一度治ったようにみえても再発しやすいことがわかっています。体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると、頭痛・吐き気・めまいなどの症状があらわれることがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

(3)以下の症状がみられたら主治医または薬剤師に相談してください。

- 不安になる、あせる
- いらいらする、興奮しやすい
- 発作的にパニック状態になる
- ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す
- 敵意を持つ、攻撃的になる
- 衝動的に行動する、じっとしていることができない

この薬との関連性は明らかではありませんが、これらの症状があらわれた人の中には、うつ症状などのもともとある病気の症状が悪化する場や、死んでしまいたいと感じたり、他人に対して危害を加えたりする場合があります。