

ファムシクロビル錠250mg「YD」の 用法・用量およびCcr早見表

ファムシクロビル錠250mg「YD」は通常、成人にはファムシクロビルとして
単純疱疹には**1回250mgを1日3回**
帯状疱疹には**1回500mgを1日3回** 経口投与する

	1日用法・用量			投与期間 (重要な基本的注意)
	朝	昼	夜	
単純疱疹				原則5日間
帯状疱疹	 	 	 	原則7日間

腎機能障害患者、血液透析患者では減量が必要です。
減量の目安については添付文書をご参照ください。

錠剤サイズ



(実物大)

直径：10.1mm

厚さ：4.4mm

質量：339mg

処方箋医薬品[※]

抗ヘルペスウイルス剤

ファムシクロビル錠250mg「YD」

Famciclovir Tab. : ファムシクロビル錠

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

薬価基準収載

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

販売元

 株式会社 陽進堂
富山県富山市婦中町萩島3697番地8号
<http://www.yoshindo.co.jp/>

製造販売元

コーアバイオテックベイ株式会社
神奈川県横浜市港北区日吉7-15-13

