

ドネペジル塩酸塩錠「YD」／OD錠「YD」を
適正に使用いただくために

レビー小体型認知症患者さんの
ご家族や介護者の皆様へ



服用にあたって

- 1日1回服用してください。
- お薬の量は主治医の指示に従ってください。
最初の1～2週間は3mg錠(黄色の錠剤)を服用します。その後、5mg錠(白色の錠剤)を服用します。5mg錠を4週間以上継続した後に10mg錠(ピンク色の錠剤)に増量します。
- 飲み忘れても2回分を1度に飲まないようにしてください。
- 過量に飲んでしまった場合は直ちに病院へ連絡してください。
- お薬を飲むことを自己判断で中止しないでください。



気を付けていただきたい症状

- 軽い吐き気や食欲不振、便が軟らかくなることがあります。

- ・ 吐き気
- ・ 食欲の低下
- ・ 下痢



- パーキンソン症状が悪くなることがあります。

- ・ 動作が遅くなる
- ・ 無表情
- ・ 筋肉のこわばり
- ・ 小刻みで歩く
- ・ 転びやすい



いつもと違う症状が続く場合は、主治医にご相談ください。

注意事項

- 次の方は直ちに医師または薬剤師にご相談ください。
 - ・ 他のお薬で皮膚などの過敏症が見られたことのある方。
 - ・ 以前にこのお薬を飲んで、異常が見られた方。
- 今、ほかに服用している薬があれば教えてください。

医療機関名

担当医師名

電話番号



株式会社 陽進堂

富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

RMP