

ファムシクロビル錠 250mg「YD」 再発性の単純疱疹(口唇ヘルペスまたは性器ヘルペス) の治療を受けられる方へ

次のような再発の初期症状があらわれた場合、症状発現後すみやかに（6時間以内）お薬を服用してください。

- 痛み（チクチク・ヒリヒリなど）
※ただし、性器ヘルペスの排尿時の痛みは含まない。
- むずむずするような違和感
- かゆみ
- 腰の痛みや違和感（性器ヘルペスの場合）

これらは、単純疱疹の再発時に一般的にみられる症状です。

● 医師の指示どおりに、お薬を服用してください。

2回服用するよう指示された場合

2回目の服用は、1回目の服用から12時間程度あけてから服用してください。12時間後が就寝中となる場合は、6～18時間後の範囲で、就寝前または起床後に服用してください。

1回のみ服用するよう指示された場合

1回のみ服用し、決して2回目の服用はしないでください。

- 妊娠中または妊娠している可能性がある方、授乳中の方は、お薬を服用せずに処方された医師に相談してください。
- 服用中、服用後に気になる症状があらわれた場合や異常（症状の増悪を含む）を感じた場合は、放置せず、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- 再発の初期症状出現後6時間以内にお薬を服用できなかった場合で、治療を希望される方は、医療機関を受診してください。

お薬の保管に関する注意

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光を避けて室温（1～30℃）で保管してください。光により淡い黄色等に変色することがあります。変色したお薬は、服用しないでください。
- お薬は湿気を避けて保管してください。
- 使用期限を過ぎたお薬は服用しないでください。

このほかにも気になることやわからないことがある場合は
医師または薬剤師に相談してください。

販売元



株式会社 陽進堂
富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

製造販売元

コーアバイオテックベイ株式会社
神奈川県横浜市港北区日吉7-15-13