

再発性の単純疱疹に対する  
(口唇ヘルペス・性器ヘルペス)  
ファムシクロビル錠250mg「YD」  
短期間投与


ブリストアカード

ファムシクロビル錠 250 mg「YD」


⑥

使用期限


④ 1回目



2回目




④




## ブリスターカードのセット方法

**1** ①を内側に折返し折り目をつけます。錠剤シート(8錠分)\*のアルミ面を上にして②にセットします


※通常用法・用量の場合




**2** ①を内側に折返し、★部分を③の切れ目に差し込みます




**3** ④を内側に折ります  
※①の上下のツメがはまっているかチェックしてください



**4** 左面の⑤を内側へ折ります



**5** ★部分を⑥の切れ目に差し込んで完成です  
※錠剤シートが固定されているかご確認ください



## 腎機能に応じた減量の目安<sup>注)</sup>

	通常用法・用量	1回1000mgを2回
クレアチニン	≥60	1回1000mgを2回
クリアランス (mL/分)	40-59	1回500mgを2回
	20-39	500mg単回
	<20	250mg単回

注) 外国人における成績をもとに設定した。

BZ002

2023年10月改訂

## 再発性の単純疱疹 (口唇ヘルペス・性器ヘルペス) に対する治療を受けられる方へ

### 注意事項

- 以下のような再発の初期症状を感じた場合、再発の初期症状出現後速やかに(6時間以内)お薬を服用してください。
  - ▶ 痛み(チクチク・ヒリヒリなど)
  - ※ただし性器ヘルペスの排尿時の痛みは含まない。
  - ▶ むずむずするような違和感
  - ▶ かゆみ
  - ▶ 腰の痛みや違和感(性器ヘルペスの場合)
  - 注) 上記の例は、再発時に一般的に認められる症状です。
- 医師の指導に従いお薬を服用してください。2回服用するよう指導された場合、2回目の服用は、1回目の服用から12時間程度あけてから服用するようにしてください。12時間後が就寝中となる場合は、6～18時間後の範囲で、就寝前又は起床後に服用してください。
- 妊娠または妊娠している可能性がある場合、授乳中の場合は、お薬を服用せずに処方医師に相談してください。
- 服用中、服用後に気になる症状があらわれた場合や異常(症状の増悪を含む)を感じた場合は、放置せず、すぐに医師・薬剤師に相談してください。また、再発の初期症状出現後6時間以内にお薬を服用できなかった場合で、治療を希望される方は、医療機関を受診してください。

### お薬の保管に関する注意

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光を避けて室温(1～30℃)で保管してください。光により淡い黄色等に変色することがあります。変色したお薬は、服用しないでください。
- お薬は湿気を避けて保管してください。
- 使用期限を過ぎたお薬は服用しないでください。

