

抗てんかん薬を服用される患者さまへ ～自動車運転について～

あなたが飲むお薬はです。

<input type="checkbox"/> ラコサミド錠50mg[YD]	<input type="checkbox"/> レベチラセタムドライシロップ50%[YD]
<input type="checkbox"/> ラコサミド錠100mg[YD]	
<input type="checkbox"/> ラコサミドドライシロップ10%[YD]	

上記のお薬を服用している方は、自動車運転に留意が必要です。以下の内容をご確認ください。

1. てんかんと診断され、抗てんかん発作薬による治療が施されている者で、自動車運転等を希望する際には、医師により十分な発作抑制効果と運転等に支障を来す副作用がないことが確認され、かつ許可されなくてはならない。
2. ストレス、睡眠不足、発熱、疲労に代表される個別のてんかん発作誘発要因を回避できない際には、自動車運転等は行わないこと。
3. 医師の処方通りに服薬すること。また服薬に際しては医師や薬剤師による指導の内容を遵守すること。
4. 抗てんかん発作薬の服用により、めまい、眠気、運動失調に代表される自動車運転等に影響を与える副作用が発生する事があるので、これらの自覚症状が生じた際には、自動車運転等を絶対に行わないこと。運転中にその様な状態になった際には、運転を速やかに中断すること。
5. てんかん以外の疾患や症状に対して処方を受ける際や市販薬を購入する際は、処方されている抗てんかん発作薬の効果や副作用に対する影響について、医師や薬剤師に確認すること。

「抗てんかん発作薬を服用しているてんかんのある人において、自動車運転や危険を伴う機械操作を行う際の留意事項 b. 抗てんかん発作薬を服用するものが注意すべきこと」
(2026年3月17日付 一般社団法人日本てんかん学会)より

裏面もご覧ください➡

ご注意いただきたいこと

- 服用中に次のような副作用が起こることがあります。症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

- めまい
- 頭痛
- 強い眠気
- 注意力・集中力・反射運動能力などの低下
- 攻撃的になる
- 死にたいという気持ちになる など

- 飲み忘れにご注意ください。
飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の通常服用する時間が近い場合は、忘れた分は飲まずに1回分をとばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- 授乳中の人は医師に相談してください。



他にも気になることがありましたら、
医師または薬剤師にご相談ください

連絡先(医療機関・薬局など)