

平成17年6月

お客様各位

株式会社 陽進堂

使用上の注意事項改訂のお知らせ

ACE - 降圧剤 デフォルダー15mg錠 (塩酸デラプリル錠)

今般、平成17年6月15日付事務連絡及び自主改訂により、下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたのでお知らせ申し上げます。(下線部分が変更箇所です。_____：事務連絡、_____：自主改訂)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

改訂内容

[禁忌]の項の(3)を、

(3) デキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフエレーシスを施行中の患者
[ショックを起こすことがある。](「相互作用」の項参照)

と変更する。

[相互作用]の「併用禁忌」の項を

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
デキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフエレーシスの施行 リポソーバー [®] イムソーバTR [®] セルソーバ [®]	アンジオテンシン変換酵素阻害剤服用中の患者は、左記のアフエレーシス中にショックを起こすことがある。	陰性に荷電したデキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートにより血中キニン系の代謝が亢進し、本剤によりブラジキニンの代謝が妨げられ蓄積することが考えられている。

と変更する。

裏面もご覧下さい。

- 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 -

[副作用]の「その他の副作用」の「その他」の項を、

	頻度不明
その他	咳、咽頭痛、倦怠感、脱力感、発汗、血清カリウム、総コレステロール、尿酸の上昇、尿糖、抗核抗体の陽性、息切れ、嘔声、浮腫、四肢の疼痛、筋痙攣、 <u>低血糖</u> ^{注3)} 。

注3)インスリン又は経口血糖降下剤の投与中に起こりやすいとの報告がある。
と変更する。

参考

企業報告

DSU No.140 (2005年7月)掲載予定

以上