

平成13年12月吉日

お客様各位

株式会社 陽進堂

## 使用上の注意事項改訂のお知らせ

### 心臓選択性 $\beta$ 遮断剤 フェルフィシユ錠 (アテノロール製剤)

今般、自主改訂により、下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたのでお知らせ申し上げます。(下線部が変更箇所です。)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。  
記

#### 改 訂 内 容

[副作用]の「その他の副作用」の項を

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、そう痒等
眼 <sup>注1)</sup>	視力異常、霧視、涙液分泌減少
循環器	低血圧、胸部圧迫感、動悸、四肢冷感、レイノー症状、間欠性跛行
精神神経系	頭痛、めまい・眩暈、不眠、眠気、うつ状態、耳鳴、耳痛、錯乱、悪夢、気分の変化、精神変調
消化器	口渇、悪心・嘔吐、食欲不振、腹部不快感、下痢、軟便、便秘、腹痛等
肝 臓	A S T (G O T)、A L T (G P T)の上昇、胆汁うっ滞性肝炎等
腎 臓	B U N、クレアチニンの上昇等
その他	倦怠・脱力感、しびれ感、浮腫・末梢性浮腫、高脂血症、脱毛、冷汗、頻尿、高血糖、高尿酸血症、C K (C P K)の上昇、乾癬様皮疹、乾癬悪化、抗核抗体陽性化、勃起障害

注1)異常が認められた場合には投与を中止すること。

と変更する。

なお、他の項は、現行のとおりとする。

参考

企業報告

D S U No.105 (2001年12月)掲載予定

以 上