

平成26年12月

お客様各位

株式会社 陽進堂

「効能・効果」「用法・用量」の追加のお知らせ

アレルギー性疾患治療剤

日本薬局方

オロパタジン塩酸塩錠

オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「YD」

オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「YD」

今般、オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「YD」/5mg「YD」（日本薬局方 オロパタジン塩酸塩錠）につきましては「効能・効果」「用法・用量」の一部変更承認を平成26年12月8日付で取得しましたので、お知らせ申し上げます。（下線部分が変更箇所です。）

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

なお、このたびの改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数を要すると思われまますので、ご使用に際しましては、ここにご案内申し上げました改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

改訂後	改訂前
<p><b>【効能・効果】</b></p> <p>成人：<u>アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴う痒痒（湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚瘙癢症、尋常性乾癬、多形滲出性紅斑）</u></p> <p>小児：<u>アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚瘙癢症）に伴う痒痒</u></p> <p><b>【用法・用量】</b></p> <p>成人：通常、成人には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。</p> <p>小児：<u>通常、7歳以上の小児には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。</u></p>	<p><b>【効能・効果】</b></p> <p>成人： アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患に伴う痒痒（湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚瘙癢症、尋常性乾癬、多形滲出性紅斑）</p> <p><b>【用法・用量】</b></p> <p>成人： 通常、成人には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。</p>

- ・改訂添付文書情報につきましては、陽進堂ホームページの医療関係者様向けサイト (<http://www.yoshindo.co.jp/>) 及び総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページ (<http://www.info.pmda.go.jp/>) にも掲載しております。

⇒裏面もご覧下さい。

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

なお、PMDAによる医薬品医療機器情報配信サービス「PMDA メディナビ」にご登録頂きますと、医薬品の重要な安全性情報がタイムリーにメール配信されます。

( <http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html> )

お問い合わせは、担当MR又は弊社営業本部までご連絡ください。

(株)陽進堂 営業本部

☎ 0120-647-734

以 上