

平成19年12月

お客様各位

株式会社 陽進堂

使用上の注意事項改訂のお知らせ

持続性選択H₁受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 セチリジン塩酸塩錠5mg「YD」 セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 (塩酸セチリジン錠)

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。(下線部分が変更箇所です。)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

改訂後			改訂前
3. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)			←記載なし
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
ピルシカイニド塩酸塩水和物	併用により両剤の血中濃度が上昇し、ピルシカイニド塩酸塩水和物の副作用が発現したとの報告がある。	機序は明らかではない。	

〈改訂理由〉

- ・ピルシカイニド塩酸塩水和物との併用により両剤の血中濃度が上昇し、副作用が発生したとの報告があるため、新たに「相互作用」の項を設け、注意喚起することに致しました。
ただし、「機序・危険因子」の項は、下記参考文献だけでは無く UCB 社の試験結果及び他の文献を勘案し、機序不明と致しました。

〈参考〉

Tsuruoka, S. , et al. : Clin. Pharmacol. Ther. 2006 ; 79(4) : 389-396

DSU No. 165 (2007年12月) 掲載予定

お問い合わせは、担当MR又は弊社営業本部までご連絡ください。

(株)陽進堂 営業本部 阿部

TEL 076-465-5181 FAX 076-466-3110

以上