

平成22年1月

お客様各位

株式会社 陽進堂

「使用上の注意事項」改訂のお知らせ

抗アルドステロン性利尿・降圧剤

ヨウラクトン錠 25  
ヨウラクトン錠 50

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。(下線部分が変更箇所です。\_\_\_\_\_：自主改訂)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

改訂後			改訂前		
[使用上の注意] 3. 相互作用 (2) 併用注意(併用に注意すること)			[使用上の注意] 3. 相互作用 (2) 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
変更なし			省略		
カリウム製剤 塩化カリウム グルコン酸カリウム アスパラギン酸カリウム等 ACE阻害剤 カプトプリル エナラプリル リシノプリル等 アンジオテンシンII受容体拮抗剤 ロサルタンカリウム カンデサルタンシレキセチル バルサルタン等 <u>アリスキレン</u> カリウム保持性利尿剤 トリアムテレン	高カリウム血症を誘発することがあるので、血清カリウム値を観察するなど十分注意する。	これらの薬剤と本剤の相加・相乗作用による血清カリウム値の上昇。 危険因子：腎障害患者、高齢者	カリウム製剤 塩化カリウム グルコン酸カリウム アスパラギン酸カリウム等 ACE阻害剤 カプトプリル エナラプリル リシノプリル等 アンジオテンシンII受容体拮抗剤 ロサルタンカリウム カンデサルタンシレキセチル バルサルタン等 カリウム保持性利尿剤 トリアムテレン カンレノ酸カリウム	高カリウム血症を誘発することがあるので、血清カリウム値を観察するなど十分注意する。	これらの薬剤と本剤の相加・相乗作用による血清カリウム値の上昇。 危険因子：腎障害患者、高齢者

カンレノ酸カリウム シクロスポリン			シクロスポリン		
変更なし			省略		

〈使用上の注意の改訂理由〉

・「併用注意」の項へのアリスキレンの追記

アリスキレンフマル酸塩錠の添付文書の「相互作用」の「併用注意」の項に「カリウム保持性利尿剤（スピロノラクトン）」が記載されていることから、記載整備のためスピロノラクトンにもアリスキレンを追記致しました。

〈参考〉

DSU No. 186 (2009年2月) 掲載予定

お問い合わせは、担当MR又は弊社営業本部までご連絡ください。

株陽進堂 営業本部

☎ 0120-647-734 FAX 076-466-3110

以 上