

平成24年1月

お客様各位

株式会社 陽進堂

「使用上の注意事項」改訂のお知らせ

糖尿病食後過血糖改善剤

日本薬局方

ボグリボース錠

製品名：ベイスロース錠 0.2mg

ベイスロース錠 0.3mg

今般、平成24年1月10日付 薬食安発0110第1号及び自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。(下線部分が変更箇所です。)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

なお、このたびの改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数を要すると思われまますので、ご使用に際しましては、ここにご案内申し上げました改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

改訂後	改訂前(部削除)
<p>[使用上の注意]</p> <p>1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)</p> <p>(1) 変更なし</p> <p>(2) 開腹手術の既往又は腸閉塞の既往のある患者 [腸内ガス等の増加により腸閉塞が発現しやすい。]</p> <p>(3)～(7) 変更なし</p> <p>4. 副作用</p> <p>(1) 重大な副作用</p> <p>1) 変更なし</p> <p>2) 腹部膨満、鼓腸、放屁増加等があらわれ、腸内ガス等の増加により、<u>腸閉塞(頻度不明)</u>があらわれることがあるので、<u>観察を十分に行い、持続する腹痛、嘔吐等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</u></p> <p>3)～4) 変更なし</p>	<p>[使用上の注意]</p> <p>1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)</p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) 開腹手術の既往又は腸閉塞の既往のある患者 [腸内ガス等の増加により腸閉塞様の症状が発現しやすい。]</p> <p>(3)～(7) 省略</p> <p>4. 副作用</p> <p>(1) 重大な副作用</p> <p>1) 省略</p> <p>2) 腹部膨満、放屁増加(いずれも頻度不明)等があらわれ、腸内ガス等の増加により、<u>腸閉塞様の症状(頻度不明)</u>があらわれることがあるので、<u>観察を十分に行い症状があらわれた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</u></p> <p>3)～4) 省略</p>

〈使用上の注意の改訂理由〉

- ・「慎重投与」の項の「腸閉塞様の症状」から「腸閉塞」への記載変更
- ・「副作用」の「重大な副作用」の項の「腸閉塞様の症状」から「腸閉塞」への記載変更
α-GI 製剤において、副作用情報が集積されたため変更を行い、注意喚起することと致しました。

⇒裏面もご覧下さい。

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

〈参考〉

DSU No. 206 (2012年1月)掲載予定

お問い合わせは、担当MR又は弊社営業本部までご連絡ください。

(株)陽進堂 営業本部

☎ 0120-647-734 FAX 076-466-3110

以 上