

平成24年11月

お客様各位

株式会社 陽進堂

「用法・用量」の変更のお知らせ

EPA製剤

ヤトリップカプセル300

(イコサペント酸エチルカプセル)

下記の通り「用法・用量」の一部変更承認を取得致しましたのでお知らせ申し上げます。(下線部分が変更箇所です)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

なお、このたびの改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数を要すると思われますので、ご使用に際しましては、ここにご案内申し上げました改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

改訂後	改訂前 (一部削除)
<p>【用法・用量】</p> <p>・閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛および冷感の改善</p> <p>イコサペント酸エチルとして、通常、成人1回600mg(2カプセル)を1日3回、毎食直後に経口投与する。</p> <p>なお、年齢、症状により、適宜増減する。</p> <p>・高脂血症</p> <p>イコサペント酸エチルとして、通常、成人<u>1回900mg(3カプセル)</u>を1日2回又は1回600mg(2カプセル)を1日3回、食直後に経口投与する。</p> <p>ただし、トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により、1回900mg(3カプセル)、1日3回まで増量できる。</p>	<p>【用法・用量】</p> <p>・閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛および冷感の改善</p> <p>イコサペント酸エチルとして、通常、成人1回600mg(2カプセル)を1日3回、毎食直後に経口投与する。</p> <p>なお、年齢、症状により、適宜増減する。</p> <p>・高脂血症</p> <p>イコサペント酸エチルとして、通常、成人1回600mg(2カプセル)を1日3回、<u>毎食直後に経口投与する。</u></p> <p>ただし、トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により、1回900mg(3カプセル)、1日3回まで増量できる。</p>

〈用法・用量の改訂理由〉

- ・「用法・用量」項に、高脂血症において、1回900mgを1日2回の投与の追記
「用法・用量」の一部変更承認を平成24年11月1日付にて取得致しました。
それに伴い、「用法・用量」の「高脂血症」の項へ1回900mgを1日2回の投与方法を追記いたしました。

〈参考〉

- ・医薬品添付文書改訂情報として、総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページ (<http://www.info.pmda.go.jp/>)に最新添付文書が掲載されます。
なお、PMDAによる医薬品医療機器情報配信サービス「PMDAメディナビ」にご登録頂きますと、医薬品の重要な安全性情報がタイムリーにメール配信されます。(<http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html>)

お問い合わせは、担当MR又は弊社営業本部までご連絡ください。

株陽進堂 営業本部

☎ 0120-647-734 FAX 076-466-3110

以上