

平成28年1月

医療関係者各位

株式会社 陽進堂

「使用上の注意」改訂のお知らせ

食後過血糖改善剤

アカルボース錠 50mg 「YD」 アカルボース錠 100mg 「YD」 (アカルボース錠)

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。(下線部分が変更箇所です。)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

なお、このたびの改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数を要すると思われまますので、ご使用に際しましては、ここにご案内申し上げました改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

改訂後	改訂前
<p>[使用上の注意] 1~7 変更なし 8. <u>臨床検査結果に及ぼす影響</u> 本剤服用中に血清1,5-AG(1,5-アンヒドログルシトール)低値を示すことがある。1,5-AGの検査結果は、<u>血糖コントロールの参考とはならないので注意すること。</u> 9, 10 従来の8, 9</p>	<p>[使用上の注意] 1~9 省略</p>

〈使用上の注意の改訂理由〉

・「臨床検査結果に及ぼす影響」の項の新設

血清1,5-AG(1,5-アンヒドログルシトール)検査について追記いたしました。

〈参考〉

DSU No. 246 (2016年2月)掲載予定

改訂添付文書情報につきましては、陽進堂ホームページの医療関係者様向けサイト(<http://www.yoshindo.co.jp/>)及び総合機構のホームページ「医薬品に関する情報」(<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)にも掲載しております。

なお、PMDAによる医薬品医療機器情報配信サービス「PMDA メディナビ」にご登録頂きますと、医薬品の重要な安全性情報がタイムリーにメール配信されます。

(<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html>)

お問い合わせは、担当MR又は弊社医薬営業本部までご連絡ください。

(株)陽進堂 医薬営業本部 ☎ 0120-647-734

以上