

医療関係者 各位

富山県富山市婦中町萩島 3697-8
株式会社 陽進堂

**軟膏基剤 日本薬局方 マクロゴール軟膏
ソルベース®
効能・効果、用法・用量変更のお知らせ**



謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度『ソルベース』につきまして、効能・効果、用法・用量の変更に伴いラベルデザインを変更致しますので、謹んでご案内申し上げます。
今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 変更内容

- ラベル
 - ①薬効分類名:水溶性軟膏基剤→軟膏基剤
 - ②記載内容整備:変更内容を抜粋

	ラベル	
旧	<p>用途:皮膚疾患、とくに湿潤性皮膚疾患の外用軟膏基剤として各種薬剤を配合する。</p> 	<p>用途 皮膚疾患、とくに湿潤性皮膚疾患の外用軟膏基剤として各種薬剤を配合する。</p> <p>1.副作用 本剤は副作用発生頻度が明確となる調査を実施していない。 (1)過敏症 過敏症状が現れた場合には、使用を中止すること。 (2)その他 乾燥した皮膚では刺激感が現れることがある。</p> <p>2.適用上の注意 (1)ヨウ素、フェノール、タンニン酸、ソルビトール、銀・水銀・ビスマスの塩を含む製剤、ペニシリン、バントランとは配合しないこと。 (2)サルファ剤と配合した場合、変色がみられるが、効力は変化しない。</p>
新	<p>効能・効果、用法・用量:軟膏基剤として調剤に用いる。また、皮膚保護剤として用いる。</p> 	<p>効能・効果 用法・用量 軟膏基剤として調剤に用いる。また、皮膚保護剤として用いる。</p> <p>1.副作用 本剤は副作用発生頻度が明確となる調査を実施していない。 (1)過敏症 過敏症状が現れた場合には、使用を中止すること。 (2)その他 乾燥した皮膚では刺激感が現れることがある。</p> <p>2.適用上の注意 (1)ヨウ素、フェノール、タンニン酸、ソルビトール、銀・水銀・ビスマスの塩を含む製剤、ペニシリン、バントランとは配合しないこと。 (2)サルファ剤と配合した場合、変色がみられるが、効力は変化しない。</p>

2. 切替エロット

包装規格	変更前 製造番号 (使用期限)	変更後 製造番号 (使用期限)	切替予定時期
500g	YAO-3(2023.9)	YAK-1(2023.10)	2019年2月上旬

※流通在庫状況により医療機関様への供給時期が前後することがありますので、何卒ご了承ください。

以上