

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

令和4年8月

医療関係者各位

株式会社陽進堂

「使用上の注意」改訂のお知らせ

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

日本薬局方

ロスバスタチンカルシウム錠

製品名：ロスバスタチン錠 2.5mg 「YD」

ロスバスタチン錠 5mg 「YD」

ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「YD」

ロスバスタチンOD錠 5mg 「YD」

(ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠)

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。
(下線部分が変更箇所です。)

ご使用に際しましては、下記改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

〈改訂内容〉

| 改訂後 | | | 改訂前 | | |
|--------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------|---------|
| 3. 相互作用 (2) 併用注意(併用に注意すること) | | | 3. 相互作用 (2) 併用注意(併用に注意すること) | | |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 変更なし | | | 省略 | | |
| バダデュスタット | 変更なし | | バダデュスタット | 省略 | |
| フェブキソスタット | 本剤とフェブキソスタットを併用したとき、本剤のAUCが約1.9倍、Cmaxが約2.1倍上昇したとの報告がある。 | フェブキソスタットがBCRPの機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。 | エルトロンボパグ | 省略 | |
| エルトロンボパグ | 変更なし | | | | |

〈改訂理由〉

先発製剤がCCDS(企業中核データシート)変更に伴う改訂を行ったため、本剤においても追記して注意喚起することと致しました。

⇒次頁もご覧下さい。

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

- DSU No.311(2022年9月発行)掲載予定
スマートフォン・タブレット版のDSUも公開されます。(https://dsu-system.jp/Web)
- 改訂添付文書情報につきましては、陽進堂ホームページの医療関係者様向けサイト(https://www.yoshindo.co.jp/)及び総合機構のホームページ「医薬品に関する情報」(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html)にも掲載しております。
- 添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」をダウンロードし、GS1バーコードを読み取ることで、PMDAホームページの最新の電子化された添付文書を確認頂くこともできます。

—添文ナビ—

iOS版



Android版



ロスバスタチン錠/OD錠「YD」のGS1バーコード



- PMDAによる医薬品医療機器情報配信サービス「PMDA メディナビ」にご登録頂きますと、医薬品の重要な安全性情報がタイムリーにメール配信されます。(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html)

お問い合わせは、担当MR又は弊社医薬営業本部までご連絡ください。

㈱陽進堂 医薬営業本部 ☎ 0120-647-734

以上