

令和6年3月

医療関係者各位

株式会社陽進堂

「使用上の注意」改訂のお知らせ

5-HT<sub>1B/1D</sub>受容体作動型片頭痛治療剤  
**エト립タン錠 20mg 「YD」**  
 (エト립タン臭化水素酸塩錠)

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。  
 (下線部分が変更箇所です。)

ご使用に際しましては、下記改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

〈改訂内容〉

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 変更なし			10. 相互作用 省略		
10.1 併用禁忌 (併用しないこと) 変更なし			10.1 併用禁忌 (併用しないこと) 省略		
10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
マクロライド系抗生物質 エリスロマイシン、ジョサマイシン、クラリスロマイシン [16.7.1 参照] 抗真菌剤 イトラコナゾール カルシウム拮抗剤 ベラパミル [16.7.2 参照] 飲食物 グレープフルーツジュース	変更なし		マクロライド系抗生物質 エリスロマイシン、ジョサマイシン、クラリスロマイシン [16.7.1 参照] 抗真菌剤 イトラコナゾール カルシウム拮抗剤 ベラパミル [16.7.2 参照] 飲食物 グレープフルーツジュース	省略	
エンシトレルビル フマル酸	本剤の血中濃度が上昇し、作用が增强するおそれがある。	エンシトレルビル フマル酸の チトクローム P450 3A に対する 阻害作用により、 本剤の代謝が阻害されることが 考えられる。	副腎皮質ホルモン剤 デキサメタゾン 抗てんかん剤 カルバマゼピン 抗結核薬 リファンピシン	省略	省略
副腎皮質ホルモン剤 デキサメタゾン 抗てんかん剤 カルバマゼピン 抗結核薬 リファンピシン	変更なし				
変更なし			省略		

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

〈改訂理由〉

・「併用注意」への追記

先発製剤において相互作用相手薬記載との整合に伴う改訂が行われたため、同様に改訂して注意喚起することといたしました。

- DSU No.325(2024年4月発行)掲載予定
- 最新の電子添文につきましては、以下ホームページをご参照ください。  
陽進堂ホームページの医療関係者様向けサイト(<https://www.yoshindo.co.jp/>)  
医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)
- 専用アプリ「添文ナビ」を用いてGS1バーコードを読み取ることで、電子添文を確認頂くこともできます。

エレクトリプタン錠 20mg「YD」のGS1バーコード



お問い合わせは、担当 MR 又は弊社医薬営業本部までご連絡ください。  
株陽進堂 医薬営業本部 ☎ 0120-647-734

以上