

令和6年4月

医療関係者各位

株式会社陽進堂

「使用上の注意」改訂のお知らせ

アルツハイマー型認知症治療剤  
ガランタミンOD錠 4mg「YD」  
ガランタミンOD錠 8mg「YD」  
ガランタミンOD錠 12mg「YD」  
(ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠)

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。  
(下線部分が変更箇所です。)

ご使用に際しましては、下記改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

〈改訂内容〉

改訂後			改訂前 (部：削除)		
10. 相互作用 変更なし			10. 相互作用 省略		
10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
コリン作動薬 アセチルコリン ベタネコール 等 コリンエステラーゼ阻害剤 ネオスチグミン等	コリン刺激作用が増強され、著しい心拍数の低下等がおこる可能性がある。	本剤とこれらの薬剤のコリン作動作用が相加的に増強される。	コリン作動薬 アセチルコリン ベタネコール <u>アクラトニウム</u> 等 コリンエステラーゼ阻害剤 ネオスチグミン等	コリン刺激作用が増強され、著しい心拍数の低下等がおこる可能性がある。	本剤とこれらの薬剤のコリン作動作用が相加的に増強される。
変更なし			省略		

〈改訂理由〉

- ・「併用注意」の相手薬剤の記載削除  
販売中止品のアクラトニウムを削除いたしました。

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

- DSU No.326(2024年5月発行)掲載予定
- 最新の電子添文につきましては、以下ホームページをご参照ください。  
陽進堂ホームページの医療関係者様向けサイト(<https://www.yoshindo.co.jp/>)  
医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)
- 専用アプリ「添文ナビ」を用いてGS1バーコードを読み取ることで、電子添文を確認頂くこともできます。

ガランタミン OD 錠「YD」のGS1バーコード



お問い合わせは、担当MR又は弊社医薬営業本部までご連絡ください。  
株陽進堂 医薬営業本部 ☎ 0120-647-734

以上